



# ADULTICIDA ZANZARE COMUNE DI CALCINAIA

## Ufficio Ambiente

### COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CITTADINI RESIDENTI

#### **L'Amministrazione comunale informa che:**

nell'ambito della campagna di lotta alla zanzara intende procedere con un trattamento di disinfestazione notturna, eventualmente da ripetersi nel mese di agosto, nelle modalità di seguito elencate.

#### **DATA :**

- Notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio 2015

#### **ORARIO:**

- Dalle ore 23.00 alle ore 02.00 frazione di Fornacette
- Dalle ore 02.00 alle ore 04.00 Calcinaia capoluogo
- Dalle 04.00 alle ore 05.00 loc. Oltrarno - Case Bianche

#### **AREE DA TRATTARE:**

- Viabilità con presenza di vegetazione di competenza pubblica (es. siepi, aiuole, alberature fratte, prunaie ect);
- Parchi e giardini pubblici;
- Sponde di fossi e canali campestri.

#### **MISURE PROTETTIVE A FAVORE DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SALUBRITÀ AMBIENTALE**

Al fine di minimizzare i rischi per la cittadinanza si ricorrerà comunque alle seguenti misure preventive:

##### **1. DOVERI DA PARTE DELL'AZIENDA ESECUTRICE**

- impiego di prodotti bio-repellenti (a base d'aglio) con impatto ambientale nullo.
- interruzione dell'intervento in caso dovesse riscontrare la presenza di persone o animali domestici nelle aree da trattare. Sarà cura degli operatori della ditta chiederne l'allontanamento.

servizio svolto  
a cura di





# ADULTICIDA ZANZARE COMUNE DI CALCINAIA

## Ufficio Ambiente

- interruzione dell'intervento in caso la ditta dovesse riscontrare la presenza di panni stesi; animali domestici; finestre aperte ect nelle immediate vicinanze delle aree soggette a trattamento;
- In caso di presenza di animali selvatici (es. uccelli nidificanti nella vegetazione) la ditta eviterà di trattare il verde interessato.
- La ditta eviterà in ogni caso la nebulizzazione della miscela bio-repellente in direzione delle aree private (abitazioni, orti, giardini, frutteti ect). Il trattamento dovrà infatti interessare esclusivamente le zone a verde di competenza comunale sopra riportate;
- In caso di forte vento il trattamento verrà sospeso e rimandato ad altra data.

### 2. DOVERI DA PARTE DEL CITTADINO RESIDENTE

- allontanarsi dalle aree da trattare all'arrivo dei mezzi per la disinfestazione;
- evitare la sosta nelle aree soggette a trattamento;
- togliere i panni stesi; togliere gli abbeveratoi per animali; chiudere porte e finestre al momento della disinfestazione (per i soli residenti nelle immediate vicinanze delle aree da trattare)
- seguire tutte le azioni di buon senso non espressamente riportate.

Si ricorda che i prodotti impiegati in questo tipo di interventi risultano fra i più sicuri oggi in commercio, in quanto dotati di una tossicità nei confronti dell'uomo ed una persistenza nell'ambiente praticamente nulla.

Tuttavia le misure precauzionali sopra elencate (ivi comprese la collaborazione e tutte quelle azioni di buon senso non espressamente riportate) assumono una notevole importanza per assicurare quei margini di sicurezza necessari ad una seria e professionale operazione di disinfestazione.

servizio svolto  
a cura di





# ADULTICIDA ZANZARE COMUNE DI CALCINAIA

Ufficio Ambiente

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### SCHEDA TECNICA N° 8057-8058 **Z-STOP**

#### PRODOTTO CONTRO LE ZANZARE IN EMULSIONE LIQUIDA CONCENTRATA

##### COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:

Succo d'aglio .....99,30 gr.

Acido citrico.....0,50 gr.

Potassio Sorbato .....0,20 gr.

##### SPETTRO D'AZIONE:

Il caratteristico odore dell'aglio risulta essere assai sgradito alle zanzare, le quali si tengono lontane dalle zone trattate anche quando il prodotto non è più percepibile dall'olfatto delle persone e degli altri animali, dotati di un apparato olfattivo molto meno sviluppato. **Z-STOP** esplica la sua azione anche contro altri insetti aventi ricettori estremamente sensibili al suo caratteristico odore come: lepidotteri (ricamatori, tignole, totrici, minatori), tisanotteri (tripidi), rincoti (afidi, psilla, cicaline, cimici, aleurodidi, cocciniglie), ditteri (mosca dell'olivo, mosca della frutta), acari.

##### MODALITA' D'IMPIEGO:

**Z-STOP** è un liquido concentrato da emulsionare in acqua.

**Primi trattamenti (2 da effettuare con cadenza settimanale):** diluire al 2% (20 ml in 1 Lt d'acqua). Per migliorare l'adesività del prodotto e prolungare la sua efficacia nel tempo si consiglia di aggiungere al preparato 25 ml di **Synergy Barrier** per ogni litro di emulsione, agitando molto bene la soluzione.

**Trattamenti di mantenimento (cadenza quindicinale):** diluire al 2% (20 ml in 1 Lt d'acqua). Per migliorare l'adesività del prodotto e prolungare la sua efficacia nel tempo si consiglia di aggiungere al preparato 25 ml di **Synergy Barrier** per ogni litro di emulsione, agitando molto bene la soluzione.

Erogare la soluzione con le normali attrezzature irroratrici-nebulizzatrici.

Erogare 1 Lt di soluzione ogni 10 mq di superficie da trattare, preferendo per il trattamento i periodi della giornata meno soleggiati che vanno dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20.

Non erogare il prodotto nelle ore più calde della giornata. Evitare di eseguire il trattamento in giorni ventosi o in previsione di piogge. In caso di pioggia nelle successive 36-48 ore successive al trattamento bisogna ripetere il trattamento.

Si consiglia di aumentare i dosaggi al 3% in caso di alte infestazioni ed al 4% in caso di altissime infestazioni.

**Si consiglia un lavaggio accurato delle cisterne e delle pompe nebulizzatrici con aceto almeno una volta al mese.**

Rev. 1.0 del 09/07/09

##### AVVERTENZE:

Simbologia di pericolo: NON CLASSIFICATO

Il prodotto è di origine naturale, non è tossico e non ha nessuna controindicazione per gli umani, gli animali e la vegetazione. Il suo tipico odore d'aglio scompare rapidamente e non determina sapori ed odori sgradevoli nelle piante e nei frutti trattati.

In caso di contatto accidentale con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.

Non contiene principi attivi, additivi o solventi di origine chimica pertanto non danneggia l'entomofauna utile, ma allontana solo temporaneamente dalla coltura, pertanto si consiglia di effettuare i lanci degli insetti utili lontani dai trattamenti.

servizio svolto  
a cura di

